

Александр ранний. Деревья сильнорослые с широко-овальной кроной. Побеги светло-коричневые с зелёным оттенком, цветочные почки размещаются вдоль всего побега. Листья мощные, среднеопушённые, светло-зелёного цвета, с острыми загнутыми книзу концами. В период плодоношения деревья вступают на третьем году, плодоносят ежегодно, но сдержанно. Сорт самоплодный. Отличается высокой зимостойкостью.

Деревья устойчивы к заболеванию курчавостью. Плод округло-приплюснутой формы, среднего размера: вес - 70-80 г, ширина - 50, высота - 40 мм.

Нижняя ямка очень широкая, среднеуглубленная. Верхняя ямка выражена слабо, около неё имеется хорошо заметный шов, который по мере приближения к середине плода совершенно теряется. Плодоножка очень короткая, но крепко прикреплена к веточке. Кожица плотная, тонкая, хорошо снимается с мякоти, бело-кремовая с тёмно-красным румянцем, который часто занимает 1/2 часть плода. Опушение короткое, густое, бархатистое.

Мякоть желтовато-белая, сочная, нежная, хорошего сладкого вкуса. Косточка округлой формы, светло-коричневая, от мякоти отделяется плохо. Плоды созревают в начале июля, сохраняются в свежем виде до 10 дней, транспортабельность слабая. Плоды хороши для стола и идут на компоты.